

3 Évolution du calendrier vaccinal des nourrissons entre 2004 et 2010

Les trois principaux changements dans le calendrier vaccinal des nourrissons qui ont eu lieu depuis 2006 sont :

- l'entrée, en janvier 2007, du vaccin contre le Pneumocoque dans le circuit de distribution des vaccins et la recommandation d'un schéma 2+1 doses. Depuis cette date, le vaccin est gratuit pour les parents alors qu'en 2006, les parents devaient l'acheter en pharmacie. La vaccination complète alors de 4 doses revenait alors à 4x66 euros, soit 264 euros
- la recommandation par le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) de la vaccination contre le Rotavirus (en deux ou trois doses suivant le vaccin). Deux vaccins oraux sont en effet disponibles et partiellement remboursés par l'AMI
- le recul de l'âge d'administration du vaccin contre le Méningocoque C de 12-13 mois à 14-15 mois.

10

Le tableau ci-dessous présente le calendrier qu'ont suivi les enfants de l'enquête ainsi que le calendrier utilisé lors de la précédente enquête. La comparaison permet de visualiser les changements survenus en 6 ans. (Les vaccins entre parenthèses ne font pas partie du circuit de distribution, ils doivent être achetés par les parents).

Tableau 2. Évolution du calendrier vaccinal entre 2004 et 2010

Calendrier	Séance	2004	2010
2 mois	1	Hexavalent1+ (Pneumocoque1)	Hexavalent1 + Pneumocoque1 + (Rotavirus)
3 mois	2	Hexavalent2+ (Pneumocoque2)	Hexavalent2 + (Rotavirus)
4 mois	3	Hexavalent3+ (Pneumocoque3)	Hexavalent3 + Pneumocoque2+ (Rotavirus)
12-13 mois	4	RRO + Méningocoque C	RRO + Pneumocoque3
14-15 mois	5	Hexavalent4 + (Pneumocoque4)	Hexavalent4 + Méningocoque C

Depuis 2007, un enfant est considéré comme complètement vacciné à l'âge de 15 mois s'il a reçu :

- 4 doses de vaccin Hexavalent (DTPa-IPV-Hib-VHB)
- 3 doses contre le Pneumocoque
- 1 dose de vaccin contre la Rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO)
- 1 dose de vaccin contre les infections à Méningocoque C (MénC).

Une vaccination complète comporte donc 9 injections et 2 (ou 3) prises orales étalées sur 5 consultations médicales (5 séances).

Alors qu'en 2006 le vaccin contre le Pneumocoque était recommandé en 3 doses avant un an et une dose de rappel après un an, aujourd'hui un schéma en trois doses, dont un rappel après l'âge de 12 mois, est recommandé.

Le vaccin contre le Rotavirus, contrairement aux autres, n'est pas disponible gratuitement même s'il est remboursé en partie. Les parents doivent donc l'acheter en pharmacie et payer le ticket modérateur (10,80€ la dose en 2010). Celui-ci est administré lors de la première séance de vaccination à 2 mois et la deuxième dose à 3 mois, une troisième dose à 4 mois est nécessaire pour l'un des deux vaccins, le Rotateq®.