

Vaccinatie voor zwangere vrouwen. Bescherm JULLIE!



Bescherming voor jou en je kind.

Dankzij het vaccin maakt je lichaam afweerstoffen tegen de ziekte aan.

Deze afweerstoffen worden ook via de placenta aan de baby doorgegeven. Ze beschermen hem tijdens de eerste weken van zijn leven.

Dit is bijzonder belangrijk, omdat bepaalde ziekten, zoals kinkhoest of RSV, zeer gevaarlijk kunnen zijn voor pasgeborenen. Vanaf acht weken kan je baby zijn eerste vaccins krijgen.

Wil je een kind? Controleer of je alle vaccins hebt gehad voor je zwanger wordt.

Bepaalde vaccins worden aanbevolen vóór de zwangerschap, zoals het BMR-vaccin (bof, mazelen, rodehond), dat met name bescherming biedt tegen rodehond. Tijdens de zwangerschap kunnen andere vaccins worden toegediend om de moeder en haar baby te beschermen.



Zijn vaccins veilig?

Vaccins worden voortdurend gecontroleerd. Vaccinatie is veel veiliger dan de ziekte oplopen waartegen het vaccin beschermt.

Waar kan je je laten vaccineren?


Bij je behandelend arts, gynaecoloog of verloskundige. Ook bij apotheken die vaccins tegen griep en COVID-19 toedienen, zonder voorschrift.

Kinkhoest

Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte die via de luchtwegen wordt overgedragen.

De aandoening veroorzaakt hevige en langdurige hoestbuien.

Niet-gevaccineerde zuigelingen kunnen ernstige vormen van kinkhoest ontwikkelen, die kunnen leiden tot ademhalingsproblemen, ziekenhuisopname en, in bepaalde gevallen, tot de dood.



Vaccinatie wordt aanbevolen voor alle zwangere vrouwen tussen de 24e en de 32e week van de zwangerschap. Het gaat om een combinatievaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest.




Het vaccin is gratis via de consultaties van Kind en Gezin en als je arts het via eVax of Vaccinet bestelt.

Griep

Griep tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op ziekenhuisopname en ernstige complicaties, en het risico op vroeggeboorte, een keizersnede of een laag geboortegewicht.

Het virus wordt gemakkelijk via de luchtwegen overgedragen en veroorzaakt koorts, hoofdpijn en spierpijn.




Vaccinatie wordt aanbevolen voor alle zwangere vrouwen. Ze kan worden uitgevoerd op elk moment tijdens de zwangerschap, tijdens het winterseizoen.



Het vaccin is betalend maar wordt deels terugbetaald door het ziekenfonds.

Coronavirus

Een besmetting met het coronavirus kan leiden tot ernstigere vormen en het risico op complicaties tijdens de zwangerschap vergroten. De vaak voorkomende symptomen zijn hoesten, koorts en vermoeidheid.



Vaccinatie is op elk moment van de zwangerschap mogelijk, het hele jaar door. Aanbevolen bij risicofactoren.




Het vaccin is gratis

Respiratoir syncytieel virus (RSV)

RSV is de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopname bij kinderen van minder dan een jaar.

De infectie begint vaak als een gewone verkoudheid, maar kan evolueren naar ademhalingsmoeilijkheden en verlies van eetlust.



De vaccinatie is mogelijk tussen de 28e en 36e week van de zwangerschap. Bepaalde criteria moeten worden beoordeeld voor de bescherming van de baby. Praat erover met je arts.



De vaccinatie van zwangere vrouwen wordt terugbetaald als de bevalling gepland is tijdens het RSV-seizoen.

Meer info?



Over vaccinatie



Over besmettelijke ziekten

