

Circulatie van het Westnijlvirus (WNV) in België en Nederland

[Het WNV](#) is een door muggen overgedragen virus dat infecties kan veroorzaken bij vogels, paarden en mensen; de meeste humane infecties verlopen asymptomatisch, maar in zeldzame gevallen kan een neuro-invasieve ziekte optreden. In augustus 2025 werd het WNV voor het eerst in België aangetroffen in het kader van een surveillanceprogramma bij wilde vogels (zie [Flash november 2025](#)). Via deze surveillance werd het virus vanaf eind mei 2026 opnieuw bij meerdere vogels aangetroffen in de drie gewesten. De voorbije weken was het virus ook voor de eerste maal verantwoordelijk voor autochtone infecties bij meerdere paarden in de brede regio rond Mechelen. In overeenstemming met het nationale plan voor surveillance, preventie en bestrijding van het WNV in België, zijn de nodige maatregelen genomen, waaronder SOHO-opvolging en sensibilisering van betrokken gezondheidsprofessionals en burgers. Het kan niet worden uitgesloten dat er de komende weken nog andere gevallen bij paarden of bij mensen zullen worden vastgesteld. WNV-infectie is [meldingsplichtig](#), zodat bijkomende maatregelen tijdig kunnen worden opgestart bij een geval. In augustus 2026 werd bij een bloeddonor in Nederland een WNV-infectie vastgesteld, in het kader van een onderzoek onder bloeddonoren uit regio's waar het WNV eerder was aangetroffen bij mensen, paarden, vogels of muggen. De donor vertoonde geen symptomen en had recent geen reizen gemaakt. Het is daarom waarschijnlijk dat de infectie in Nederland is opgelopen. Daarnaast is recent iemand overleden die in Nederland met het WNV was besmet. Sinds begin 2026 zijn drie gevallen van WNV-infectie gemeld die in Nederland zijn opgelopen. De laatste humane WNV-infecties in Nederland dateerden van 2020.

Tijgermug surveillance - Hoe staat het met de tijgermug in België?

[Sinds het begin van het muggenseizoen in mei tot 15 augustus 2026](#), werden tijgermuggen gemeld door burgers in elf gemeenten. In Vlaanderen gaat het om Boom, Kessel-Lo, Kraainem, Kuurne, Merelbeke-Melle, Rotselaar, Schelle, Wijnegem en Zaventem, en in Wallonië om de gemeente Aywaille en Ath. In Aywaille, Kraainem, Kuurne en Rotselaar werd de tijgermug voor het eerst waargenomen, terwijl in de andere gemeenten ook in voorgaande jaren al tijgermuggen werden waargenomen. Bovendien heeft de actieve surveillance die in een aantal geselecteerde gemeenten wordt uitgevoerd – met behulp van vallen – bevestigd dat de soort nog steeds voorkomt in Hoegaarden, Merelbeke-Melle, Wijnegem, Zaventem, Boom en Ath. De resultaten wijzen er ook op dat de tijgermug zich steeds meer vestigt in deze gemeenten. Naast de overlast die ze veroorzaakt, kan ze ook een belangrijke rol spelen bij de overdracht van virussen (dengue, chikungunya en Zika). Het monitoren van muggenpopulaties vormt dan ook een essentieel onderdeel van de paraatheid en preventie op het gebied van de volksgezondheid. De informatie die hieruit voortvloeit, is onmisbaar om de ontwikkeling van de situatie op te volgen en de bevoegde autoriteiten in staat te stellen passende maatregelen te nemen. Bevestigde gevallen van dengue, chikungunya en zika zijn meldingsplichtig. Bij vermoeden van een arbovirusinfectie moeten muggenwerende maatregelen al vóór labo-bevestiging worden opgestart, om te vermijden dat lokale tijgermuggen besmet raken. Bent u huisarts? Neem dan deel aan de [enquête over kennis, houding en klinische praktijken met betrekking tot door muggen overgedragen ziekten in België](#) en deel deze met uw collega's!

Salmonella Enteritidis – Uitbraak gelinkt aan een eierproducent in België

Sedert februari 2025 werden in België infecties met een specifieke stam van *Salmonella* Enteritidis gedetecteerd door het [Nationaal Referentiecentrum \(NRC\) voor *Salmonella* spp](#) op basis van Whole Genome Sequencing (WGS). Het aantal patiënten steeg in het najaar van 2025 en de regionale gezondheidsautoriteiten startten in samenwerking met Sciensano bronbevragingen. Via traceerbaarheidsonderzoek door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) op basis van de verkregen informatie, werd een link gevonden met een specifieke eierproducent. Staalname in het bedrijf door het FAVV vond *Salmonella* met dezelfde WGS stam terug in omgevingsstalen van één van de vier stallen van het bedrijf en de eieren werden [in mei uit de verkoop gehaald](#), gevolgd door het verwijderen van de leghennen uit de betrokken stal en hygiënische maatregelen. De besmettingen namen hierna echter niet duidelijk af en nieuwe staalnames vonden de betrokken *Salmonella* stam in faecesstalen afkomstig uit een andere stal, waarop de eieren van het bedrijf op [10 augustus uit de verkoop werden gehaald](#), gevolgd door uitgebreidere maatregelen (verwijderen leghennen alle stallen). Tot op 26 augustus 2026 werden 308 gevallen geregistreerd, dit is een onderschatting aangezien niet alle zieken een arts raadplegen en er niet altijd een stoelgangstaal afgenomen wordt. Het NRC volgt de komende weken op of het aantal besmettingen afneemt. Via het EpiPulse platform van het ECDC werden slechts enkele gevallen gemeld buiten België.

Mazelen uitbraken - Waakzaamheid blijft geboden

Na grote uitbraken in 2024 (526 gevallen, incidentie 42/miljoen) en 2025 (371 gevallen, 28/miljoen) blijft het aantal gevallen van mazelen in België dit jaar voorlopig beperkt tot een 40-tal. Niettemin blijft waakzaamheid geboden. Elders in de wereld woeden grote uitbraken van mazelen. Zo kampt Mongolië met een zeer intense uitbraak (incidentie >1.000/milj). Ook in [Bangladesh](#) zou de incidentie inmiddels op >1.000/milj liggen. Daar werden dit jaar al meer dan Nieuwsbrief uitgegeven door de Dienst Preventieve Geneeskunde en Beheer van Gezondheids- en Welzijnsrisico's van Vivalis, in samenwerking met Sciensano.

140.000 gevallen van mazelen gemeld, met minstens 900 overlijdens, vooral bij jonge ongevaccineerde kinderen. Hoewel de incidentie in de VS relatief laag blijft (10/milj) toont het [recente overlijden](#) van twee ongevaccineerde personen aan dat heropflakkingen van mazelen ook in Westerse landen catastrofale gevolgen kunnen hebben. Twee dosissen van het mazelenvaccin bieden 97% bescherming. Elke gelegenheid moet gebruikt worden om de vaccinatiestatus na te kijken en zo nodig in orde te brengen. Voor internationale [reizen naar risicogebieden](#) kan het vaccinatieschema versneld worden. [Meld](#) elk vermoeden van [mazelen](#) snel, zodat tijdig postexpositiemaatregelen kunnen worden genomen.

***Cyclospora* infecties – Clusters in de Verenigde Staten en Mexico**

In de Verenigde Staten (VS) zijn er [verschillende clusters van *Cyclospora* infecties](#) lopende, met meer dan 18.000 zieken in 45 staten. Een grote uitbraak wordt gelinkt aan [ijsbergsalade afkomstig uit Mexico](#), en leidde tot een [recall](#). Ook het Verenigd Koninkrijk (VK) meldt een toename van dergelijke infecties na een reis naar Mexico. De Britse gezondheidsdienst UKHSA [meldde tussen 30 april en 15 juli 2026 in totaal 67 infecties](#). Van de 51 mensen met bekende reisgeschiedenis waren er 48 in Mexico geweest, vooral in Riviëra Maya en Cancun. Dergelijke uitbraken bij reizigers in de zomer zijn niet ongewoon, maar het huidige aantal meldingen in het VK ligt hoger dan normaal. *Cyclospora cayetanensis* komt vooral voor in tropische regio's, wordt overgedragen via besmet water, of via groenten en fruit die daarmee in contact kwamen (geen directe overdracht van mens op mens), en kan waterige diarree, krampen, nausea en gewichtsverlies veroorzaken. In België zijn individuele infecties niet meldingsplichtig. Tot 11 augustus bevestigde het [Nationaal Referentielaboratorium voor Parasieten](#) vier gevallen in België, alle met reisgeschiedenis naar Mexico en/of de VS, tegenover drie in 2025 en acht in 2024.