

Griep - Epidemiologische update over luchtweginfecties

In de laatste [wekelijkse bulletins over acute luchtweginfecties \(week 38 tot 40\)](#) heeft de Risk Assessment Group (RAG), onder meer op basis van de tool '[Respi-radar](#)', aangegeven dat de epidemiologische situatie op 'groen' blijft staan. De meeste indicatoren stijgen, maar blijven op een laag niveau. De indicatoren die toenemen zijn het aantal consultaties bij huisartsen voor acute luchtweginfecties (ALI), het aantal ziekenhuisopnames voor ernstige acute luchtweginfecties en de verschillende indicatoren voor SARS-CoV-2. Wat influenza en het respiratoir syncytieel virus (RSV) betreft, blijven de indicatoren op basisniveau. Op [internationaal](#) niveau zien we een brede en toenemende verspreiding van SARS-CoV-2 in de EU/EER, maar met een beperkte impact op de ziekenhuisopnames. De verspreiding van RSV en het influenzavirus blijft op een zeer laag niveau.

Shigatoxine producerende Escherichia coli (STEC) – update van de uitbraak in België

In de vorige flash berichtten we over een uitbraak met STEC-infecties in enkele woonzorgcentra (WZC) in België. Het onderzoek is ondertussen afgerond en er komen geen nieuwe gevallen meer bij. Er werden in totaal 66 gevallen (waaronder 10 overlijdens) gelinkt aan deze uitbraak, in 8 WZC in Vlaanderen, 1 in Wallonië en 1 in Brussel. Over een totaal aantal bewoners in de betrokken WZC van 1.195, geeft dit een attack rate van 5,5%. Uit de epidemiologische analyses (case-control studie in 3 WZC), kwam rauw gehakt naar voor als de meest waarschijnlijke bron. Door afwezigheid van resten van dit product kon dit niet in het laboratorium bevestigd worden. Het FAVV, AVIQ, Departement Zorg en Vivalis op 26/09/25 een [Gezamenlijk persbericht](#) na afsluiting van deze uitbraak, en roept op om voorzichtig te zijn met bepaalde voedselproducten bij vatbare personen (jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen of immuun gecompromitteerde personen).

Legionella cluster – Limburg

In augustus en september is een legionella-uitbraak vastgesteld met acht Belgische patiënten op datum van 25/9, met een epidemiologische link naar Maasmechelen (start symptomen tussen 5/8 en 19/9) en één bijkomend geval uit Nederland. De patiënten zijn tussen 41 en 84 jaar oud. Om Legionella-pneumonie tijdig te kunnen opsporen, is verhoogde waakzaamheid ingesteld bij huisartsen en ziekenhuizen. Het belang van afname van humane stalen is benadrukt om een mogelijke match met omgevingsstalen te kunnen maken. Bij de patiënten wordt een gedetailleerde bronbevestiging uitgevoerd. Aan de hand van de gegevens en bijkomende modellering is een gebied afgebakend waarbinnen de bron zich meest waarschijnlijk bevindt. Sinds 10/9 worden omgevingsstalen genomen en maatregelen gevraagd bij installaties met verneveling. Het vinden van de exacte bron bij legionella-uitbraken blijft echter vaak moeilijk. De verhoogde waakzaamheid blijft van kracht tot en met 17/10.

Candidozyma auris – Verspreiding van Candidozyma auris in Europa en België

Het [ECDC rapporteert](#) dat de multiresistente schimmel Candidozyma auris zich snel verspreidt in Europese ziekenhuizen¹. In 2023 werden 1 346 gevallen gemeld in 18 landen, vooral in Spanje, Griekenland, Italië, Roemenië en Duitsland. De schimmel kan lang overleven op oppervlakken en medische apparatuur, wat bestrijding bemoeilijkt. Sinds 2016 zijn in België 21 patiënten geïdentificeerd, waarvan 5 zonder buitenlandse ziekenhuislink². De meeste Belgische isolaten zijn resistent tegen fluconazol, maar grotendeels gevoelig voor amphotericine B en echinocandines. C. auris is meldingsplichtig in alle gewesten en isolaten moeten naar het [NRC Mycosen](#) worden doorgestuurd. Alle gezondheidsinstanties benadrukken het belang van vroege detectie, snelle isolatie en strikte infectiecontrole om verdere verspreiding te voorkomen.

Circulerend vaccin-afgeleid poliovirus type 1 (cVDPV1) - Israël 2025

In augustus 2025 meldde [Israël](#) een uitbraak van circulerend verwilderd poliovirus afkomstig van een vaccinstam type 1 (cVDPV1). In december 2024 werd een geval vastgesteld van acute slappe verlamming (AFP) bij een niet-gevaccineerde adolescent. Stoelgang- en respiratoire stalen testten positief op een poliovirus dat leek op het virus dat in orale polio vaccins gebruikt wordt, maar reeds een aantal mutaties had ([Sabin-like poliovirus 1](#)). Omdat het onbekend was hoe de jongeman met dit virus in aanraking gekomen was, werd de surveillance van afvalwater opgeschroefd. Bij het testen van afvalwater werd ditzelfde type virus nog verschillende malen teruggevonden, evenals een verwant type dat nog verder 'verwilderd' was door opstapeling van mutaties (VDPV1). VDPV1 werd geïsoleerd op verschillende locaties en gedurende meerdere maanden, wat wijst op aanhoudende overdracht in de gemeenschap en dus officieel een uitbraak van circulerend VDPV1 (cVDPV1). Hoewel de algemene vaccinatiegraad in Israël hoog is, zijn er in het bijzonder rondom Jeruzalem en in de ultra-orthodoxe gemeenschap gebieden met lagere vaccinatiegraad. Daar wordt nu actief gecommuniceerd en gevaccineerd. Deze uitbraak wijst eens te meer op het risico op herintroductie van polio en het belang van het handhaven van een hoge vaccinatiegraad. Elk geval van acute slappe verlamming [moet gemeld worden](#) aan Departement Zorg en polio formeel uitgesloten door het testen van twee stoelgangsstalen. Reizigers naar [risicogebieden](#) moeten een extra dosis polio vaccin krijgen.

¹ [Drug-resistant fungus Candidozyma auris confirmed to spread rapidly in European hospitals: ECDC calls for urgent action](#)

² [Nationaal Referentiecentrum \(NRC\) voor Mycosis | sciensano.be](#)

Ebola – Epidemie in de DRC

Op 4 september 2025 werd een [ebola-epidemie](#) (Zaire-stam) uitgeroepen in de Democratische Republiek Congo (DRC). Het getroffen gebied Bulape is moeilijk bereikbaar en ligt op minstens één dag rijden van de provinciale hoofdstad van Kasai, Tshikapa. Het eerste gemelde geval was een zwangere vrouw die op 20 augustus in het ziekenhuis werd opgenomen met compatible symptomen. Ze overleed ten gevolge van meervoudig orgaanfalen. Uit de analyse van de volledige genoomsequentie blijkt dat de verantwoordelijke stam geen verband houdt met eerdere epidemieën en dat het waarschijnlijk om een nieuw geval van zoönotische overdracht gaat. Op 21 september waren er 57 gevallen gemeld in de provincie Kasai (47 bevestigde, 10 waarschijnlijke) en 35 sterfgevallen (waarvan 10 waarschijnlijke), met een letaliteit onder alle gevallen van 61,4 %. Er zijn gevallen gemeld bij personen van 0 tot 65 jaar, waarbij kinderen van 0 tot 9 jaar (23 % van de gevallen) en vrouwen (61 % van de gevallen) het meest getroffen waren. Daarnaast werden er 1.180 contacten geïdentificeerd, waarvan er 94 de 21 dagen durende surveillance hebben voltooid. Door de verbinding van Bulape met grote stedelijke centra zoals Tshikapa en Kananga, en aangezien het interprovinciale en grensoverschrijdende verkeer doorgaat, bestaat volgens de WGO AFRO het risico van verdere geografische verspreiding. Op 24 september waren 1.740 personen gevaccineerd en zijn er 2.410 extra dosissen beschikbaar in het getroffen gebied.